云 南 植 物 研 究 2006, 28 (5): 468
Acta Botanica Yunnanica

西藏和云南槭树科新资料*

陈又生
(中国科学院植物研究所系统与进化植物学国家重点实验室, 北京 100093)

New Data of Aceraceae Plants in Xizang and Yunnan, China

CHEN You-Sheng
(*State Key Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences*, Beijing 100093, China)

Abstract: *Acer tonkinense* H. Lecomte and *Acer wilsonii* Rehder are newly recorded for Xizang, *Acer campbellii* var. *serratifolium* Banerji is a new record from China.

Key words: New records; *Acer*; Xizang; Yunnan; China
关键词: 新记录; 槭属; 西藏; 云南; 中国
中图分类号: Q 949 **文献标识码**: A **文章编号**: 0253-2700(2006)05-468-01

作者在编写 Flora of China 槭树科的过程中, 整理鉴定大量的标本, 发现两个西藏分布新记录种以及一个中国分布新记录变种, 现记载如下。

粗柄槭

Acer tonkinense H. Lecomte, Fl. Indo-Chine **1**: 1054. 1912; W. P. Fang in Fl. Peipubl. Popularis Sin. 46. 179. 1981; van Gelderen, P. C. De Jong et Oterdoom, Maples of the World 137. 1994. Type: North Vietnam, Ninh-Binh, H. F. Bon s. n. (Holotype, P!, Isotype, WAG!)

西藏: 墨脱, 阿尼桥, 1992. 10. 29, 孙航、周浙昆、俞宏渊 ETM-0965 (KUN); 墨脱, 邦辛, 1983. 01. 15, alt. 1 350 m, 李渤生、程树志 2538 (PE); 墨脱, 马蹄, alt. 850～1 100 m, 1983. 01. 21, 李渤生、程树志 2640 (PE); 墨脱, 汗密, alt. 1 400 m, 1983. 06. 24, 李渤生、程树志 5243 (PE)

分布: 广西西南部、云南南部, 西藏东南部; 越南也有分布。西藏为新记录。

三峡槭

Acer wilsonii Rehder in Sargent, Trees & Shrubs **1**: 157. t. 79. 1905; W. P. Fang in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, Bot. Ser. **11**: 108. 1939; W. P. Fang in Fl. Peipubl. Popularis Sin. 46. 173. t. **51**: 1. 1981—— *Acer campbellii* Hook. f. et Thoms. ex Hiern subsp. *wilsonii* (Rehder) P. C. De Jong in van Gelderen, P. C. De Jong et Oterdoom, Maples of the World 129. 1994. Type: China. Hubei. E. H. Wilson 303 (Holotype, A!; Isotypes, K!, NY!)

西藏: 墨脱, 沈泽昊 11 (PU)

分布: 湖北、重庆、江西、湖南、贵州、云南、广东、广西、西藏。越南、缅甸也有分布。西藏为新记录。

重齿藏南槭 新拟

Acer campbellii Hook. f. et Thoms. ex Hiern var. ***serratifolium*** Banerji in Joum. Bom. Nat. Hist. Soc. **58** (1): 306. 1961. Type: India. Sikkim. 10, 000ft, Lace 2250 (Holotype, E!)

Acer campbellii auct. non Hook. f. et Thoms. ex Hiern (1875): W. P. Fang in Fl. Peipubl. Popularis Sin. 46. 149. t. 42. 1981, p. p.

本变种叶片大型, 叶背沿叶脉密被柔毛, 叶基心形, 裂片边缘有重锯齿, 花序较长。

西藏: 聂拉木, 章木至立新乡, alt. 2 600 m, 青藏队 6031 (KUN, PE).

云南: 贡山, 冯国楣 8187 (PE), 俞德俊 19281 (PE), 19235 (PE); 福贡, 蔡希陶 54379 (PE), 56596 (KUN, PE), 58362 (PE); 维西, 毛品一 7 (PE), 冯国楣 4890 (PE); 凤庆, 俞德俊 16038 (PE)

分布: 海拔 1 800～2 800 m 混交林中, 西藏东南部、云南西北部; 印度东北部、尼泊尔、不丹。本变种为我国新记录。

* 基金项目: 国家自然科学基金 (30470128, 3989940, 30499340) 及中国科学院知识创新工程项目 (KSCX-SW-122)
收稿日期: 2005-12-05, 2006-02-06 接受发表
作者简介: 陈又生 (1972-) 男, 博士, 主要从事槭树科和堇菜科的分类学研究。